


EDITION SALARIES

LE BRUIT, TOUS CONCERNÉS !



SUD LOIRE SANTÉ
AU TRAVAIL

ECHELLE DU BRUIT



CONSEQUENCES SUR L'ORGANISME


The figure shows the following health consequences:

- RISQUE D'ACCIDENT ACCRU** (Warning triangle icon)
- Altération de l'audition**
 - Perte auditive partielle ou totale
 - Bourdonnements / sifflements
 - Fatigue auditive
 - Isolement du salarié
- Dépression**
 - Fatigue, tremblements
 - Troubles du sommeil
 - Maux de tête
 - Vertiges, perte d'équilibre
 - Troubles de la mémoire, de la concentration et de l'humeur
- Troubles de la vision**
 - Vision nocturne perturbée
 - Difficulté d'appréciation des distances
 - Temps de perception des couleurs plus long
- Troubles respiratoires**
 - Fréquence respiratoire augmentée
- Troubles cardio-vasculaires**
 - Hypertension artérielle
 - Accélération du rythme cardiaque
- Troubles digestifs**
 - Ralentissement du transit intestinal
 - Crampes / spasmes gastriques
- Troubles sexuels**
 - Stérilité
 - Impuissance
- Chez la femme enceinte** (Warning triangle icon)
 - Risque d'atteinte auditive chez le fœtus
- DANGER SOLVANTS** (Warning triangle icon)
- Attention aux co-expositions !**

BON À SAVOIR !

➔ 8h à 80 dB(A) = 2h à 85 dB(A) = 30 mn à 92 dB(A)

➔ 3 dB de plus : vous **DOUBLEZ** le niveau sonore !



LES TYPES DE PICB (Protecteurs Individuels Contre le Bruit)



Bouchons d'oreilles

Bouchons
d'oreilles moulés
sur mesure




Casque de
protection
sonore

DURÉE DE PORT DES PICB ET EFFICACITÉ



100%
d'efficacité si
portés pendant 8h



30%
d'efficacité si
portés seulement
pendant 7h



SUD LOIRE SANTÉ
AU TRAVAIL

www.slst.fr